

OPMERKINGEN VOOR DE ARTS

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van biociden geldig zijn.

Dit product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C.

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING

De verpakking volledig ledigen. De lege verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De lege, gereinigde verpakking moet volgens de regionale voorschriften afgevoerd worden. Vijvers, waterlopen, beken of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd ; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit.

Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven ; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



Nederland

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingsnummer Nederland : 12094 N

Aard van het preparaat : lokaas

Werkzame stof : imidacloprid

Gehalte : 2,15%

GEVARENAANDUIDING :

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGEL :

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT :

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kakkerlakken door pleksgewijze toepassing in kieren en spleten in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en in transportmiddelen.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door :

- personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
- personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Het middel is bestemd voor toepassing in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en ketelhuizen, schepen en overige plaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.

De gel door middel van de spuit direct toedienen in kieren en spleten. De te gebruiken hoeveelheid per m² of per lopende meter bedraagt 1 druppel gel voor de Duitse kakkerlak en 2 druppels gel bij hoge infectiedruk of bij de bestrijding van andere kakkerlakken.

De gel aanbrengen in de directe schuilplaatsen van kakkerlakken. Het gebruik van lijmvallen zal helpen in het bepalen van de plaatsen met verhoogde activiteit van de

insecten. Men dient te vermijden het lokaas aan te brengen op open plaatsen of blootgestelde oppervlakken. Bij opeenvolgende bezoeken moeten de plaatsen met de gel worden nagekeken en aangevuld op zwaar besmette plaatsen indien nodig. Indien de gel volledig werd opgegeten moet de gel daar opnieuw worden aangebracht, omdat vele insecten waaronder kakkerlakken secreta en uitwerpselen nalaten om soortgenoten aan te trekken. Zowel de pleksgewijze toepassing als de toepassing in kieren en spleten kan uitgevoerd worden terwijl de behandelde ruimte in werking is.

EERSTE HULP MAATREGELEN

De verontreinigde kledij verschonen. Na contact met de huid, onmiddellijk en overvloedig wassen met water en zeep. Na contact met de ogen : overvloedig met water spoelen, een dokter raadplegen als de pijn aanhoudt. Na inslikken : een dokter raadplegen in geval van onpasselijkheid (en hem zo mogelijk het etiket van het product tonen).

WAARSCHUWING :

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.

Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience SA-NV zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden zodat Bayer CropScience SA-NV in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.



Belgien



Zulassungsnummer : 3299B (Bayer CropScience SA-NV)

Formulierung : Fertigmöbel (RB) auf der Basis von 2,15 %

Imidacloprid

Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on (CAS 2634-33-5),

5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methyl-isothiazol-3-on (CAS 55965-84-9).


Gefahrenhinweise

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.



Maxforce
WHITE IC

INSECTICIDE

✓ **Résistant à de fortes fluctuations de température et d'humidité.**

✓ **Bestand tegen grote temperatuurs- en vochtigheidsschommelingen.**

**Contre les blattes germaniques et américaines
Tegen Duitse en Amerikaanse kakkerlakken**

Numéro d'autorisation Belgique : 3299 B

Formulation : gel prêt à l'emploi

Matière active : imidaclopride (CAS 138261-41-3)

Concentration : 2,15%

Toelatingsnummer Nederland : 12094 N

Toelatingsnummer België : 3299 B

Aard van het preparaat : gebruiksklare gel

Werkzame stof : imidacloprid (CAS 138261-41-3)

Gehalte : 2,15%

Blattes • Kakkerlakken



**Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Voor professioneel gebruik.**

**Lire la notice ci-jointe avant emploi.
Pour usage professionnel.**

Gevarenaanduidingen :
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen :
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Mentions de danger :
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence :
P501 Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Tel. Antigifcentrum : +32 (0) 70 245 245
Tél. Centre Antipoisons : +32 (0) 70 245 245

Numéro de lot : voir emballage
Lotnummer : zie verpakking
Uiterste houdbaarheidsdatum : zie verpakking.
Date limite d'utilisation : voir emballage.

Une autorisation de / Een toelating van :
Bayer CropScience NV/SA
J.E. Mommaertslaan 14 - 1831 Diegem
tel : 02 535 63 11

Maxforce® White IC is een gedeponeerd merk van Bayer.
Maxforce® White IC est une marque déposée de Bayer.

Bayer



Bayer Environmental Science.
Toelatingshouder :
Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231 - 3640 AE Mijdrecht
Tel.nr.: 0297-280413

BLX81722250F - ARTICLE 81676356



Belgique

Numéro d'autorisation : 3299 B

Formulation : gel prêt à l'emploi

Matière active : imidaclopride

Concentration : 2.15%

Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (CAS 2634-33-5) et un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (CAS 55965-84-9).

USAGE PROFESSIONNEL

Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. Utiliser les produits biocides avec précaution. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter tout risque pour l'homme et l'environnement.

UTILISATION

Usage destiné à la lutte contre les blattes germaniques (*Blattella germanica* L.) et les blattes américaines (*Periplaneta americana* L.) par application locale dans les interstices et les fentes. Peut être appliqué dans des bâtiments commerciaux, industriels, agricoles, résidentiels et des moyens de transport.

CARACTERISTIQUES

L'appât Maxforce® White IC est un gel prêt à l'emploi à base d'imidaclopride. Le gel contient des éléments nutritionnels très attractifs et des composants colloïdaux qui constituent une source d'eau pour les blattes. La consistance particulière du gel lui permet d'adhérer facilement sur toutes les surfaces. L'appât Maxforce® White IC possède une grande efficacité contre les blattes à leurs différents stades de développement.

DOSAGE

Appliquer directement le gel dans les interstices et les fentes au moyen du pistolet applicateur. Dans les zones infestées, appliquer 1 goutte de gel par m² ou par mètre linéaire pour la blatte germanique et 2 gouttes pour la blatte américaine. En cas de fortes infestations, augmenter le nombre de gouttes en conséquence.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le gel dans les refuges directs des blattes. L'utilisation des pièges adhésifs permet de déterminer les endroits fortement infestés. Eviter de déposer l'appât dans les endroits non couverts ou sur les surfaces exposées. Lors des contrôles, vérifier les endroits traités et réappliquer le gel si nécessaire dans les endroits fort fréquentés. Lorsque le gel est entièrement consommé, le réappliquer au même endroit car les

blattes laissent des sécrétions et des excréments pour attirer leurs congénères. Le gel peut être appliqué localement et dans les interstices sans interrompre une quelconque activité dans le local traité.

MENTIONS DE DANGER

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

CONSEILS DE PRUDENCE

P501 Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

REMARQUES

Ne pas appliquer le gel à proximité des aliments, des ustensiles de cuisine et des surfaces qui sont en contact avec des denrées alimentaires. Ne pas appliquer le gel aux endroits où un nettoyage régulier peut déplacer l'appât vers des surfaces qui entrent en contact avec des denrées alimentaires. Ne pas appliquer le gel à des endroits régulièrement nettoyés à l'eau, car le lavage peut éliminer le dépôt de gel. Ne pas appliquer le gel à des endroits récemment nébulisés avec un insecticide. Ne pas nébuliser d'insecticide sur le gel. L'application du gel sur du textile et du tissu peut entraîner une décoloration.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

PREMIERS SECOURS

Inhalation : air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
Ingestion: rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Projection dans les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

REMARQUES POUR LE MEDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245.

MESURES DE PRECAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de biocides. Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel. Ne pas exposer à des températures supérieures à 40°C.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES

Vider complètement l'emballage. L'emballage vide ne peut être utilisé à d'autres fins. Traiter l'emballage vide et rincé conformément aux dispositions régionales. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit.

L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



België

Toelatingsnummer : 3299 B

Aard van het product : gebruiksklare gel

Werkzame stof : imidacloprid

Gehalte : 2.15%

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS 2634-33-5) en een mensel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9).

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Vóór gebruik de gebruiksaanwijzing lezen. Maak op een voorzichtige wijze gebruik van biociden. Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

GEBRUIK

Bestrijding van Duitse kakkerlakken (*Blattella germanica* L.) en Amerikaanse kakkerlakken (*Periplaneta americana* L.) door lokale toepassing in kieren en spleten. Kan toegepast worden in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en transportmiddelen.

KENMERKEN

Het lokaas Maxforce® White IC is een gebruiksklare gel op basis van imidacloprid. De gel bevat zeer aantrekkelijke voedingselementen en colloïdale bestanddelen die een bron van water vormen voor de kakkerlakken. Door de bijzondere consistentie van de gel wordt hij gemakkelijk aangebracht op alle oppervlakken. Het lokaas Maxforce® White IC is bijzonder effectief tegen kakkerlakken in de verschillende stadia van hun ontwikkeling.

DOSERING

De gel door middel van een pistool direct toedienen in kieren en spleten. In de besmette zones, 1 druppel gel per m² of per lopende meter toepassen voor de Duitse kakkerlak en 2 druppels voor de Amerikaanse. Bij hevige besmettingen het aantal druppels overeenkomstig verhogen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De gel aanbrengen in de directe schuilplaatsen van kakkerlakken. Het gebruik van lijmvallen zal helpen bij het bepalen van de plaatsen met verhoogde activiteit van de insecten. Men dient te vermijden het lokaas aan te brengen op open plaatsen of blootgestelde oppervlakken. Bij controles, moeten de behandelde plaatsen nagekeken worden en de gel zo nodig

opnieuw aangebracht worden op zwaar besmette plaatsen. Indien de gel volledig werd opgegeten moet de gel daarna opnieuw worden aangebracht, omdat kakkerlakken secreta en uitwerpselen nalaten om soortgenoten aan te trekken. Zowel de pleksgewijze toepassing als de toepassing in kieren en spleten kan uitgevoerd worden terwijl de behandelde ruimte in werking is.

GEVARENAANDUIDINGEN

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

OPMERKINGEN

De gel mag niet worden aangebracht op plaatsen waar eten, voer of materiaal of oppervlakken die met eten of voer in contact komen, gecontamineerd kunnen worden. De gel mag niet aangebracht worden op plaatsen waar routinereiniging de gel kan verplaatsen naar oppervlakken die met eten of voer in contact komen.

De gel mag niet worden aangebracht op plaatsen die regelmatig gedweild worden, omdat de gel kan verwijderd worden door het wassen. De gel niet aanbrengen op plaatsen waar recent insecticiden werden verneveld en geen insecticiden vernevelen over de gel. Het aanbrengen op textiel en stoffen kan leiden tot verkleuring.

AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE EERSTE HULP

EERSTE-HULP-MATREGELEN

Inademen : frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken : spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing van actieve houtskool in water aangewezen is. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid : spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen : spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Zo er symptomen zijn, raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.